

OSKRBA ČEBELJIH DRUŽIN SKOZI LETO

Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju
čebelarstva, v RS letih 2014–2016

1

Prvi pregled čebeljih družin:

- v februarju
(kolikor so slabe razmere preverimo ali so družine žive in nič ne odpiramo panjev) – preverimo s cevko ali stetoskopom
- Če vreme dopušča pa preverimo ali matica zalega in je zadosti hrane
- so čebele mirne, če šumijo preverimo ali je matica prisotna- dovolj je če je zalega

Pripravil: Franc Gosar

2

Drugi pregled:

V začetku marca, odvisno od vremena

- Pregledamo moč zalege
- Označimo slabiče in v kolikor je možno jim pomagamo ali pa jih likvidiramo (združimo z močnejšo družino)
- Dodamo hrano v obliki pogače – v satni pitalnik, ali še boljše kantico s sladkorno rastopino, razen v primeru, če je še dovolj hrane

Pripravil: Franc Gosar

3

Naslednji pregledi:

- V kolikor nam vreme dopušča na cca 10 dni izvršimo hiter pregled družine in po možnosti (iz rezervnih družin) pomagamo slabičem, dodamo lahko tudi novo rezervno družino, po potrebi tudi hrano. Pri vsakem pregledu si zabeležimo stanje družine.
- Če je družina že vsaj na 4 satih, jih lahko razmaknemo in vstavimo na sredino meden sat, ob boke pa prazen sat
- Dodamo gradilnik

Pripravi: Franc Gosar

4

V kolikor nimamo označene matice je zadnji čas, da jih označimo in po potrebi tudi pristrižemo krila

- Konec aprila pa so čebele že zalegle gradilnike in če je trotovska zalega že pokrita začnemo izvajati Apitehnične ukrepe – izrezovanje trotovine (mora pa biti pokrita)

Pripravi: Franc Gosar

5

Še o rojenje: (konec aprila, maj)

Naravna značilnost čebel je tudi izražena volja po razvoju. Ker je značilnost naše čebele hiter spomladanski razvoj, je tudi v primerjavi z drugimi vrstami čebel zelo rojiva. V literaturi se rojenje v večini povezuje s prostorom za zaleganje (premalo prostora) in številčnostjo. Kljub temu se vedno poudarja, da obstojajo tako imenovana rojeva leta.

Pripravi: Franc Gosar

6

Načini s katerimi omejujemo rojenje:

- Dodajanje satnih osnov
- Izrezovanje trotovine
- Izkoriščanje čebelje družine, kot je smukanje cvetnega prahu
- Najlažji način preprečevanja rojenja pa je zagotoviti čebelji družini močno pašo.

Pripravi: Franc Gosar

7

Paše:

Začnejo se v aprilu na oljni repici, slaedi cvetlična paša, ki se nato nadaljuje s pašo na javorju in akaciji.

Ob močni paši na akacij, se običajno konča tudi rojevo razpoloženje. Nato sledijo paše na lipi, kostanju in smreki, zaključí pa se s hojo.

Ob paši lahko dodamo nove satne osnove, običajno v medišče – dobimo zelo kvaliteto satje

Pripravi: Franc Gosar

8

Pri točenju je potrebno paziti:

- Ali je med dozorel (kontrolirati vsebnost vode), zahteva je da je pod 18,7% vode, normalno pa velja, da naj bo vsebnost vode pod 16 %.
- Včasih je problem kostanjeva in javorjeva paša.

Pripravi: Franc Gosar


9

Po točenju (velja posebno za čas po kostenju):

- Normalno po točenju čebelalji družini vsaj enkrat dodamo sladkorno razstopino, razen v primeru če je donos v naravi
- Običajno po kakšnem tednu preverimo stanje v družinah, če nismo med točenjem poškodovali matice, lažje pa tudi ocenimo kakšno je stanje družine

Pripravi: Franc Gosar

10



Poskrbimo, da ne pride do ropa:

- 1.omejimo žrela,
- 2.spremljajmo odvzem hrane, da ne ostaja
- 3.pazimo, da ne polivamo sladkorne razstopine
- 4.krmimo zvečer
- 5.ne dajemo satja niti pitalnikov (preprosto nič) pred čebeljak
6. pregled izvajamo zgodaj zjutraj ali proti večeru, satje na kozici, naj bo čim manj časa da po nepotrebnem ne vznemirjamo družine
7. Prehitro ne zapažimo čebel

Pripravi: Franc Gosar

12
